Mercaptol

Traitement curatif de la réduction

Mercaptol est une solution stabilisée à base de sulfate de cuivre qui élimine les goûts de réductions dus à la présence de sulfure d'hydrogène ou de thiols volatils. Les sulfures de cuivre formés précipitent, ils doivent être éliminés du vin. Sa concentration en sulfate de cuivre est de 25 g/L.

Doses d'emploi :

Doses usuelles : **0,3 à 1,5 cL/hL** de **Mercaptol** suivant la nature des goûts de réduction et **après essais préalables**.

Mode d'emploi :

Il est **indispensable** de pratiquer des essais en laboratoire pour déterminer la dose requise.
Dans les cas des vins blancs et rosés, procéder par ajouts successifs en vérifiant entre chaque ajout et après 12 heures :

- l'impact organoleptique
- la teneur résiduelle en cuivre

Incorporer la dose déterminée par essais au cours d'un remontage au volume de vin à traiter.
Après quelques heures, un collage à la bentonite à la dose de 5 à 10 g/hl s'impose pour éliminer les sulfures de cuivre formés et éviter ainsi les goûts métalliques.

Utilisation soumise au respect des apports limites en sulfate de cuivre fixés à 1 g/hL et sous réserve que le vin ne contienne pas plus de 1 mg/L de cuivre après traitement.

Présentation :

Solution de couleur bleu azur disponible à la demande en 1, 5 et 10 litres.

Conservation :

A conserver non ouvert à l'abri de la lumière.

25 mai 05

CONFORME AU CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL